

Прививка против коклюша, дифтерии и столбняка вакциной АДАСЕЛЬ

Вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (бесклеточная), комбинированная, адсорбированная **АДАСЕЛЬ** (производство – Канада).

Показание для введения вакцины АДАСЕЛЬ:

- ревакцинация против столбняка, дифтерии и коклюша у лиц в возрасте от 4 до 64 лет.

Противопоказания для введения вакцины АДАСЕЛЬ:

- анафилактические реакции в анамнезе на лекарственные препараты, содержащие дифтерийный, столбнячный анатоксин и коклюшную вакцину;
- энцефалопатия (нарушения сознания, повторные судороги) в течение 7 дней после введения вакцины, содержащей коклюшный компонент, если не установлена другая причина;
- прогрессирующие неврологические заболевания, неконтролируемая эпилепсия или прогрессирующая энцефалопатия;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний являются временными противопоказаниями (в таких случаях вакцинация проводится после выздоровления или в период ремиссии).

Способ применения и дозы

Вакцина АДАСЕЛЬ вводится в/мышечно в дельтовидную мышцу плеча.

Вакцину АДАСЕЛЬ нельзя вводить в ягодичную мышцу, нельзя вводить в/кожно и подкожно.

При необходимости, в соответствии с национальными рекомендациями, вакцина АДАСЕЛЬ может применяться вместо вакцины против дифтерии и столбняка для ревакцинации против дифтерии, столбняка и коклюша у детей старшего возраста, и взрослых.