

Прививка против гемофильной инфекции

Гемофильная инфекция (Хиб-инфекция) – это одно из распространенных инфекционных заболеваний, вызывается гемофильной палочкой. Основной путь передачи – воздушно-капельный. Самое тяжелое клиническое проявление – менингит. Гемофильная инфекция является причиной гнойных менингитов у детей в возрасте до 5 лет в 35 – 50% случаев. К другим клиническим проявлениям относятся пневмония, эпиглотит, отит, синусит.

Для профилактики гемофильной инфекции используются **вакцина ХИБЕРИКС** (производитель – Бельгия), **вакцина АКТ-ХИБ** (производитель Франция).

Вакцинация может проводиться **комбинированными вакцинами**, включающими компонент против гемофильной инфекции:

пятикомпонентные вакцины ЭУПЕНТАм (производитель - Корея) и **Пентаксим** (производитель - Франция);

шестикомпонентные вакцины Гексаксим (производитель – Франция), **Инфанрикс-Гекса** (производитель – Бельгия).

Курс первичной вакцинации состоит из 3 прививок, которые проводятся в первые 6 месяцев жизни, начиная с 2-месячного возраста по схеме:

2 месяца – первая вакцинация;

3 месяца – вторая вакцинация;

4 месяца – третья вакцинация.

Для детей других возрастов предусмотрены другие схемы вакцинации согласно инструкции к применению.